



Obstetric Anaesthetists' Association (Асоциация по акушерска анестезия)

Целта на тази карта е да Ви даде известна информация по въпроса за приспиването с обща анестезия.

- Общата анестезия често се налага в случаи на спешно необходимо цезарово сечение, ако не е на разположение достатъчно време за поставяне на спинална или епидурална упойка.
- В ръката Ви ще бъде поставена игла, наречена интравенозна канюла.
- Един от рисковете на общата анестезия се състои в това, че киселината от стомаха Ви може да попадне в белите дробове, докато спите. За да се намали този риск, може да Ви бъде поставена система или инжекция в крака и да получите антиацидно лекарство (медикамент против киселини).
- В операционната зала ще поставят на лицето Ви маска, през която да вдишвате кислород. Маската може да се усеща като тясно прилепнала, но това е важно, за да получавате допълнителен кислород.
- Общата анестезия ще бъде поставена в системата Ви. Когато заспите, ще почувствате натиск в шията. Целта е да се предпазят дихателните Ви пътища и белите дробове.
- Вашият партньор няма да има възможност да бъде при Вас в операционната зала, но ще е наблизо.
- Ще се събудите в залата за възстановяване и можете да видите бебето си веднага щом сте будни.
- След събуждането може да усещате сухота в гърлото си и прилошаване.

Ако имате нужда, ще получите допълнителни обезболяващи и средства срещу повръщане.

Във Великобритания годишно се поставят 17 000 общи анестезии при жени с цезарово сечение и усложненията са малко. Все пак общите анестетици имат някои рискове и странични ефекти. Те са показани на обратната страна на тази карта.

РИСКОВЕ И СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ НА ОБЩАТА АНЕСТЕЗИЯ

Възможен проблем	Честота на проблема
Треска	Често - приблизително 1 на 3 души
Възпалено гърло	Често - приблизително 1 на 2 души
Гадене	Често - приблизително 1 на 10 души
Мускулни болки	Често - приблизително 1 на 3 души
Срязвания или охлузвания на устните и езика Увреждане на зъби	Понякога – приблизително 1 на 20 души Доста рядко – приблизително 1 на 4 500 души
Анестезиологът не успява да постави дихателна тръба, когато спите Инфекция на дихателните пътища Киселина от стомаха навлиза в белите дробове	Рядко – приблизително 1 на 250 души Често – приблизително 1 на 10 души – но повечето инфекции не са тежки Доста рядко – приблизително 1 на 1 000 души
Будно състояние по време на процедурата	Много рядко – приблизително 1 на 400 души
Тежка алергична реакция	Рядко – приблизително 1 на 10,000 души

Смърт или увреждане на мозъка	Смърт: Изключително рядко – по-малко от 1 на 100,000 (1 или 2 души годишно във Великобритания) Увреждане на мозъка: Много рядко – не са известни точни цифри
-------------------------------	--

Точни цифри за всички тези рискове и странични ефекти не са на разположение. Цифрите са приблизителни оценки и могат да се различават в отделните болници. Ако имате някакви въпроси, трябва да ги обсъдите с Вашия анестезиолог.

**Повече информация можете да получите чрез изтегляне на брошурата
'Анестезия за цезарово сечение' от уеб сайта на
Royal College of Anaesthetists:
www.rcoa.ac.uk.**

