



بڑی آپریشن کے لیے جنرل بے ہوش کرنے والا سکشن (سی ایس) معلوماتی کارڈ

یہ کارڈ آپ کو کچھ معلومات دے گا کہ سلا دے آپ کو ایک عام سی بے ہوش کرنے والی دوائی سے

- جنرل یا عمومی بے ہوش ہونے کے لئے ایک بڑے آپریشن کے لئے اگر ہمارے پاس بہت وقت نہ ہو ریڑھ کی ہڈی یا ڈیور کو بے ہوش کرنے کے لئے
- آپ کے بازو میں پہلے ایک انجکشن لگا دیا جاتا ہے جس کو نلکی نما اندرونی ورید کہا جاتا ہے
- ایک خطرہ عمومی بے ہوش کرنے کا کہ تیزابی مادہ آپ کے معدہ سے پیپھڑوں میں داخل ہوجاتا ہے جب آپ سو جاتے ہیں اس خطرے کو کم کرنے کے لئے آپ کو ٹانگ میں، ڈراپ کے ذریعے ایک انجکشن دیا جاتا ہے اور آپ کو تیزابیت کم کرنے کے لئے دوائی دی جاتی ہے
- آپریشن تیئہر میں آپ کے چہرے پر ماسک ڈال دیا جاتا ہے جس سے آپ آکسیجن لیتے ہیں ہو سکتا ہے ماسک جکڑہ ہوا ہو لیکن یہ ضروری ہے اضافی آکسیجن یا سانس لینے کے لئے
- عمومی بے ہوش ہونے کے لئے اسے آپ کو ڈرپ میں دیا جاتا ہے جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ دباؤ محسوس کریں گے اپنے گردن پر
- یہ کہ حفاظت رہے آپ کے سانس لینے والی نالیوں اور پیپھڑوں کا، آپ کا پیدا ہونے والا ساتھی آپ کے پاس نہیں ہوگا آپریشن تیئہر میں لیکن وہ آپ کے قریب ہوگا
- آپ جاگیں گے شفا والے کمرے میں اور اپنے بچے کو دیکھ سکیں گے بہت جلد جب آپ جاگ جاتے ہیں
- جب آپ جاگ جاتے ہیں تو آپ اپنے حلق میں زخم اور اس کو بخار ہوتے محسوس کریں گے اور بھی بہت درد اور بخار کو کم کرنے والی دوائی موجود ہوگی اگر کبھی آپ کو اس کی ضرورت ہو

انگلینڈ میں ہر سال 17000 عورتوں کو عمومی بے ہوش کیا جاتا ہے بڑے آپریشن کے لیے اور اس میں بہت ہی کم مشکلات ہوتی ہے مگر پھر بھی اس میں بہت ہی کم خطرات ہوتی ہے اور غیر متوقع رد عمل عمومی بے ہوش ہونے سے یہ کارڈ کے دوسرے صفحے پر موجود ہے

خطرات اور غیر متوقع رد عمل عمومی بے ہوش ہونے سے

ممكنہ مسائل	کتنا عام ہے یہ مسئلہ
لرزہ چڑھنا یا تھرتھراانا	عام ہوتی ہے - ایک میں 3 سے لوگوں میں
حلق کا بخار	عام ہوتی ہے - ایک میں 2 سے لوگوں میں
بخار محسوس کرنا	عام ہوتی ہے - ایک میں 1 سے لوگوں میں
پٹھوں کا درد	عام ہوتی ہے - ایک میں 3 سے لوگوں میں
کٹ یا جلد کی رنگت اڑنا یا خراش ہونٹوں یا زبان کا دانتوں کا خراب ہونا	کبھی کبھار - ایک میں 20 سے عام ہوتی ہے - ایک میں 4500 سے لوگوں میں
بے ہوش ہونے والا عمل ناکام ہوتا ہے جب سانس والی نالی کو ڈال دیا جاتا ہے جب آپ سو رہے ہو سینہ کی انفکشن یا جراثیم پھیلنا تیزاب کا معدہ سے پیپھڑوں میں داخل ہونا	عام نہیں ہوتی ہے - ایک سے 250 میں عام ہوتی ہے - ایک میں 1 سے لوگوں میں انفکشن یا جراثیم کا پھیلنا شدید ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے - ایک میں 000 سے لوگوں میں
عمل کے دوران جاگ جانا	عام نہیں ہوتی ہے - ایک سے 400 میں
الرجی کے ردعمل کا شدید ہونا	بہت ہی کم ہوتی ہے - ایک میں 1 سے 10,000 تک
موت ہونا یا دماغ کا نقصان ہونا	موت: بہت ہی کم ہوتی ہے ایک سے 100,000 یا دو لوگوں میں ایک سال میں انگلینڈ میں: دماغ کا نقصان ہونا بہت ہی کم - صحیح ہندسہ کا اندازہ مشکل ہے

صحیح ہندسہ موجود نہیں ہے تمام خطرات کا یا غیر متوقع رد عمل کا ہندسوں کا اندازہ ہے اور ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال تک بدلتی رہتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ کو ماہر خدر یا بے ہوش کرانے والے ڈاکٹر سے رجوع کریں

آپ اور معلومات حاصل کرسکتے ہیں اس صفحے کو داؤن لوڈ کرنے سے بڑے آپریشن کرانے والے سکشن کے لئے روینل کالج بے ہوشی کا ویب سائٹ
www.rcoa.as.uk

ہم بہت شکر گزار ہے اپنے عطیہ دینے والے بغیر بارڈر ترجمانوں کا جو ہمیں یہ ترجمہ مہیہ کرتے ہیں او اے اے (OAA) کے لئے



General anaesthesia for Caesarean section - Feb 2015 - Urdu

رجسٹر عطیہ نمبر 1111382

www.labourpains.com