



产科麻醉医师协会

剖腹产全身麻醉

本卡片旨在为你提供有关全身麻醉的信息。

- 紧急剖腹产时，如果没有足够时间进行腰麻和硬膜外麻醉，通常需要进行全身麻醉。
- 你的手或手臂上会放入留置针。
- 全身麻醉的风险之一，是麻醉后胃酸反流进入肺部。为了降低这种风险，你可能会要以打吊针的方式输液或进行腿部输液，你也可以服用抗酸药。
- 在手术室中，你的脸部会戴上氧气面罩，为你提供氧气。氧气罩可能会感觉很紧，但这对于提供额外供氧是很重要的。
- 全身麻醉药会以打吊针的方式输入。在你入睡后，你会感到颈部有压力。这是为了保护你的气道和肺部。
- 在手术室内，你的陪护将无法伴随在你身边，但陪护会就在附近。
- 你会在恢复室里醒来，并且可以立刻见到你的孩子。
- 醒来后，你的咽喉可能会有疼痛感，你也可能会感到恶心。如有需要，你可以获得更多的止痛药和抗呕吐药。

英国每年要为选择剖腹产的女性进行17000起全身麻醉，其中出现并发症的情况很少。然而，全身麻醉有一些风险和副作用。这些信息印刷在本卡片背面。

全身麻醉的风险和副作用

可能会出现的症状	症状发生几率
发抖	常见 – 每3人中约有1人发生
咽喉痛	常见 – 每2人中约有1人发生
恶心	常见 – 每10人中约有1人发生
肌肉酸痛	常见 – 每3人中约有1人发生
嘴唇与舌头受伤或淤青	偶尔 – 每20人中约有1人发生
牙齿损伤	相当罕见 – 每4500人中约有1人发生
麻醉后气管插管失败	不常见 – 每250人中约有1人发生
胸部感染	常见 – 每10人中约有1人发生 – 不过大多数感染都不严重
胃酸反流进肺部	相当罕见 – 每1000人中约有1人发生
手术过程中苏醒	不常见 – 每400人中约有1人发生
严重过敏反应	罕见 – 每10000人中约有1人发生
死亡或脑损伤	死亡： 非常罕见 – 每10万人中不到有1人发生（英国一年1到2人） 脑损伤： 非常罕见 – 具体数字未知

并非所有的风险和副作用都有精确数据统计。以上发生几率为估计值，不同医院的数据可能会有所不同。如果有任何疑问，请咨询你的麻醉师。

要想获取更多信息，你可以从麻醉医师皇家学院网站下载“剖腹产麻醉”小册子。
麻醉医师皇家学院网站为www.rcoa.ac.uk。

感谢无国界翻译为产科麻醉医师协会将本文译成中文。无国界翻译是一家慈善组织。



Registered Charity No

1111382

www.labourpains.com