

مقامی حصے کو بے ہوش کرنے والی بڑا آپریشن کرنے والا سکشن - معلوماتی کارڈ

مقامی بے ہوش کرنے والی (ٹیور کے اوپر یا بیرونی یا ریڑھ کی ہڈی کو بے ہوش کرنا) ایک قسم کا درد ہے جہاں آپ کو انجکشن دیا جاتا ہے مقامی حصے کو بے ہوش کرنے والی آپ کے نچلے کمر کے حصے کو جس سے آپ کے سینے کے نچلے والا حصہ مکمل طور پر سن ہو جاتا ہے۔ آپ کی ٹانگیں بھی سن ہو جاتی ہے اور آپ اس کو حرکت نہیں دے سکتے مکمل اثر لینے میں اس کو دس سے بیس مینٹ لگتے ہیں بے ہوش کرنے کے لیے۔

بے ہوش کرنے کا عمل

آپ کو پہلے ایک ڈراپ لگا دیا جاتا ہے ایک انجکشن سے جس کو نلکی نما اندرونی ورید کہا جاتا ہے، آپ کے بازو میں لگا دیا جاتا ہے

ایک بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر ایک مقامی بے ہوش کرنے والی انجکشن کو آپ کے کمر کے نچلے والے حصے میں ڈال دے گا

آپ کو ایک نلکی بھی دی جاتی ہے جسے پیشاب کی سلانی کہتے ہیں ڈال دیا جاتا ہے جو مٹانہ کو خالی کرتی ہے

آپ کے بلڈ پریشر اور آکسیجن کو بار بار کنٹرول یا چیک کیا جاتا ہے

کچھ ہسپتالوں میں آپ کے ساتھی کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ رہے اس عمل کے دوران، لیکن دوسرے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا بعد میں آجائیں

مقامی حصے کو بے ہوش کرنے کے فائدے

یہ ایک محفوظ عمل ہے اگر آپ کو ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے یہ آپ کو اس قابل یا اہل بناتی ہے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور درد کم ہو جاتا ہے مقامی بے ہوش ہونے والے حصے بہت مؤثر ہوتا ہے بنسبت ان کے جنرل بے ہوش ہونے والے حصے

جنرل یا پورا حصے کو بے ہوش کرنے کے ممکن مسائل

- بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر آپ کو چیک کرے گا کہ آپ بے ہوش ہے اس سے پہلے کہ آپریشن شروع کیا جائے یہ چیک سو فیصد قابل اعتماد نہیں ہیں اور آپ کو مخصوص ہوگا ایک ناخوش گوار احصاں آپریشن کے دوران
- یہ عام بات ہے کہ مخصوص کریں پیٹ میں دھکا اور کینچھنے کے عمل کو، اور آپ کو یہ مخصوص نہیں ہوگا کچھ لمحوں کے لیے یہاں پر ہلکا سا درد بھی ہوگا جس کا علاج درد مٹانی والی دوائی سے کیا جاتا ہے جو ڈراپ میں دیا جاتا ہے یا سانس لیا جائے ایک ماسک کے ذریعے یا منہ پر لگانے والے ٹکڑے سے کبھی کبھار شدید درد بھی

محصوص ہوگا اگر ایسا ہوگا، تو بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر آپ کو پورا بے ہوش کرنے والی دوائی بہت جلدی دے دے گا یہ آپ کو سلا دے گا

• یہ بے ہوش ہونے میں عام ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر گر جائے یہ آپ کو بخار دے گا یا بیہوش کر دے گا آپ کا بے ہوش کرنے والا ڈاکٹر آپ کو دوائی دے گا کہ علاج کرسکے پہلے کہ یہ واقع ہو آپ کے ساتھ کبھی کبھار دوائی ایسی علامات نمودار ہونے سے پہلے دی جاتی ہے

پورے بے ہوش کرنے کے خطرات اور مضر اثرات

مسئلہ کتنا عام ہے	ممکنہ مسائل
عام ہوتی ہے - ایک میں 3 سے 10 لوگوں تک منحصر ہوتی ہے دوائی کی مقدار لینے میں ریڑھ کی ہڈی: عام ہوتی ہے - ایک میں 5 سے	خارش یا کھجلی بلڈ پریشر کا کم ہونا یا گرنا
ڈیور کے اوپر یا بیرونی: کبھی کبھار - ایک میں 50 سے عام ہوتی ہے - ایک میں 8 سے 10 لوگوں تک ریڑھ کی ہڈی: کبھی کبھار - ایک میں 20 سے ڈیور کے اوپر یا بیرونی: عام ہوتی ہے - ایک میں 7 سے ریڑھ کی ہڈی: کبھی کبھار - ایک میں 50 سے ڈیور کے اوپر یا بیرونی: کبھی کبھار - ایک میں 20 سے	ڈیور کام کرنے کے دوران موثر نہیں ہوتا کافی ہوگا اوپر تاکہ اگر دوسرا بار بے ہوش کرنے کی ضرورت پڑے، بڑے اپریشن کے لیے بے ہوشی اگر نہ ہو تو اور دوائی کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ درد کو کم کیا جاسکے اپریشن کے دوران مقامی حصے کو بیہوش کرنا، کام نہیں کرتی ایک بڑے اپریشن میں، اور ایک جنرل یا پورا بیہوش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے
ڈیور کے اوپر یا بیرونی: عام نہیں ہوتی ہے - ایک سے 100 میں ریڑھ کی ہڈی: عام نہیں ہوتی ہے - ایک سے 500 میں	شدید سر درد
اثر ہونا آخری 6 مہینوں سے: بہت ہی کم ہوتی ہے - ایک میں 1,000 سے 2,000 تک اثر ہونا آخری 6 مہینوں سے: بہت ہی کم ہوتی ہے	اعصاب کا نقصان (مثال کے طور پر، ٹانگ میں کسی پیچ کا سن ہونا یا پاؤں میں، یا کمزور ہونا ٹانگ کا)
بہت ہی کم ہوتی ہے - ایک میں 1 سے 100,000 تک	گردن توڑ بخار یا ریڑھ کی ہڈی کی سوزش
بہت ہی کم ہوتی ہے - ایک میں 50,000 تک بہت ہی کم ہوتی ہے - ایک میں 168,000 تک بہت ہی کم ہوتی ہے - ایک میں 1 سے 100,000 تک	پھوڑا (انفکشن یا جراثیم پھیلنا) ریڑھ میں کی طرف ریڑھ کی ہڈی یا ڈیور کے: خون کا گومڑ (خون کا جمنا) ریڑھ میں، ریڑھ کی ہڈی میں یا ڈیور میں پھوڑا یا خون کا گومڑ شدید زخم کا باعث بنتی ہے، جس میں فالج کا اثر ہونا (آدھے دھڑ کا فالج) شامل ہیں
بہت ہی کم ہوتی ہے - ایک میں 1 سے 100,000 تک بہت ہی کم ہوتی ہے - ایک میں 1 سے 2,000 تک	ڈیور کے اوپر یا بیرونی کے ساتھ: بہت ہی بڑی مقدار میں مقامی حصے کو بیہوش کرنی والی انجکشن دیا جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی کے ایک رگ میں بہت ہی بڑی مقدار میں مقامی حصے کو بیہوش کرنی والی انجکشن دیا جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی کے مایہ میں دیا گیا ہے جو سبب بنتی ہے جس سے تکلیف ہوتی ہے سانس لینے میں، بہت ہی کم، کبھی کبھار

صحیح ہندسہ دستیاب یا میسر نہیں ہے ان سارے خطرات یا غیر متوقع عمل کا ہندسوں کا صرف اندازہ ہے اور تبدیل ہوتی رہتی ہے
ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال تک

یہ کارڈ ایک خلاصہ ہے ویب سائڈ پر اور بہت سارے معلومات ہیں جو کہ یہ ہے www.labourpains.com
اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو برائے مہربانی اپنے ماہر خدر یا بیہوش کرنے والے ڈاکٹر سے طلب کریں

ہم بہت شکر گزار ہے اپنے عطیہ دینے والے بغیر بارڈر ترجمانوں کا جو ہمیں یہ ترجمہ مہیہ کرتے ہیں او او اے (OAA) کے لیے



Obstetric Anaesthetists' Association 2012 ©

رجسٹر عطیہ نمبر 1111382

www.labourpains.com

By: Muhammad Irshad.

m.irshad909@gmail.com