

Epidural Information Card - Punjabi 2008

ਐਪੀਡੂਰਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਡ

ਲੇਬਰ ਵਿਚ ਐਪੀਡੂਰਲ - ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਹ ਕਾਰਡ ਇਕ ਸਾਰ ਹੈ - ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.oaaformothers.info ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ । ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਨਿਸਥੇਟਿਸਟ (ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ।

ਐਪੀਡੂਰਲ ਲਗਵਾਉਣਾ-

- ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਧਮਣੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੂਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ (ਪਤਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟਿਊਬ)ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਿਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪੀਡੂਰਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਿਸਥੇਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ।
- ਐਪੀਡੂਰਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਭੱਗ 20 ਮਿੰਟ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭੱਗਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ 20 ।
- ਕਈ ਵਾਰ ਐਪੀਡੂਰਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਿਸਥੇਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਪੀਡੂਰਲ ਕੈਥੀਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਐਪੀਡੂਰਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

- ਐਪੀਡੂਰਲ ਲੇਬਰ ਦਾ ਦਰਦ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ।
- ਕਈ ਵਾਰ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰਨ (ਮੰਜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ) ਵਾਸਤੇ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ - 'ਮੋਬਾਇਲ ਐਪੀਡੂਰਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
- ਆਮ ਕਰਕੇ ਐਪੀਡੂਰਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।
- ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਪੀਡੂਰਲ ਕੈਥੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਐਪੀਡੂਰਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਵ ਖਤਰੇ-

- ਬਾਰ ਬਾਰ ਟੋਪਅਪ ਕਾਰਣ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਮਜੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਾਸਤੇ ਔਜਾਰ (ਫੋਰਸੈਪਸ ਜਾਂ ਵੈਂਟੂਸ) ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
- ਐਪੀਡੂਰਲ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਥੋੜੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
- ਤੁਹਾਡਾ ਐਪੀਡੂਰਲ ਦੌਰਾਨ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਕ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
- ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਐਪੀਡੂਰਲ ਦੀ ਜਗਾਹ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਬਾਏ ਤੋਂ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
- ਐਪੀਡੂਰਲ ਨਾਲ ਪਿੱਠ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ , ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪੀਡੂਰਲ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸਦਾ ਹੈ

ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਡ

ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਜਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਦੇ ਖਤਰੇ

ਖਤਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ	ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ	ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ
ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਘਟਣਾ	50 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ	ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ।
ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣ	8 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ	ਆਮ ਹੈ ।
ਵੱਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ	20 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ	ਕਦੇ ਕਦੇ
ਤੇਜ ਸਿਰਦਰਦ	100 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ (ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਨਾਲ) 500 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ (ਸਪਾਈਨਲ ਨਾਲ)	ਅਸਾਧਾਰਣ, ਨਿਰਾਲਾ
ਨਸ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਤ ਜਾਂ ਪੈਰ ਤੇ ਸੁੰਨ ਜਗਾਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਤ)	ਬੇੜੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ- 1000 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ	ਦੁਰਲੱਭ
ਮਗੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿਣਾ 6	ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ- 13000 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ	ਦੁਰਲੱਭ
ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਦੀ ਜਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋੜਾ	50,000 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ	ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ
ਮੈਨਿੰਜਾਈਟਸ (ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਝਿੱਲੀ) ਦਾ ਰੋਗ	100,000 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ	ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ
ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਦੀ ਜਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੀ ਫੁੱਟੀ ਜੰਮਣਾ	170,000 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ	ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ
ਅਚਾਨਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ	100,000 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ	ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ
ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸੱਟ ਅਤੇ ਅਧਰੰਗ	250,000 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ	ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ

ਛਪੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਠੀਕ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਉਪਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।-ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ

ਇਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਲਈ ਐਪੀਡਿਊਰਲ ਬਾਰੇ ਦਸਦਾ ਹੈ