

Informace o epidurální anestézii

(Tato informace je jenom rámcová. Detailní informace dostanete na www.oaaformothers.info Nejasnosti prodiskutujte s anesteziologem.)

Zavádění epidurální anestézie

- Budete potřebovat kanylu (jehlu) do žíly a pravděpodobně kapačku.
- Při zavádění epidurálu je důležité, abyste se nehýbala a také abyste dala anesteziologovi vědět, když budete mít porodní bolest.
- Zavádění epidurálu trvá asi 20 minut a pak je třeba vyčkat 20 minut na účinek.
- Někdy epidurál neúčinkuje plně a je třeba jej přizpůsobit nebo znovu zavést.

Výhody epidurální anestézie

- Vynikající úleva od porodních bolestí ve většině případů.
- Někdy se dává na začátku spinální anestézie pro rychlejší účinek.
- Dávka a druh místního anestetika se může podle okolností změnit tak, aby Vám to umožnilo na chvíli opustit postel. Tomu se říká mobilní epidurál.
- Všeobecně vzato epidurál nemá negativní vliv na plod.
- Epidurál je možno doplnit tak, aby se dal použít na císařský řez.

Jaké problémy může mít epidurální anestézie?

- Opakované dávky koncentrovaného místního anestetika mohou způsobit dočasnou nehybnost nohou a mohou zvýšit riziko porodu kleštěmi nebo s vakuovou extrakcí.
- Druhá doba porodní může být trochu prodloužena.
- Během epidurálu můžete mít nízký tlak, svědění nebo zvýšenou teplotu.
- Místo vpichu může být citlivé, ale většinou jen několik dní. Bolest zad NENÍ způsobena epidurálem, ale je po jakémkoli porodu častá.

Na druhé straně karty najdete informace o nejdůležitějších rizicích epidurální anestézie.

Informace o epidurální anestézii

Rizika spojená s epidurální nebo spinální anestézií pro úlevu od porodních bolestí

Druh rizika	Kolikrát se to stane?	Jak časté to je?
Pokles krevního tlaku	Jedna z 50 žen	Občas
Neúplný účinek takže je třeba použít jinou metodu úlevy bolesti	Jedna z 8 žen	Časté
Neúplný účinek pro císařský řez takže je třeba dát celkovou anestézii	Jedna z 20 žen	Někdy
Těžká bolest hlavy	Jedna ze 100 (epidurální anestézie) Jedna z 500 (spinální anestézie)	Málokdy
Poškození nervu (necitlivé místo na noze nebo slabá noha) Účinek trvajícím více než 6 měsíců	Dočasné – jedna z 1000 žen Permanentní – jedna z 13 000 žen	Zřídka
Epidurální abscess (infekce) Zápal mozkových blan Epidurální výron krve (krevní sraženina)	Jedna z 50 000 žen Jedna ze 100 000 žen Jedna ze 170 000 žen	Velmi zřídka
Ztráta vědomí (dočasná)	Jedna ze 100 000 žen	Velmi zřídka
Těžké poškození, včetně permanentního poškození míchy	Jedna z 250 000 žen	Velmi zřídka