

Epidural Information Card

इपिड्यूरलको बारे जानकारीपत्र

यो जानकारीपत्र छोटकरीमा दिइएको हुनाले_विस्तृत विवरणका निम्ती www.oaa.mothers.info मा हेर्नुहोला । यदि कुनै विषयमा दुविधा उत्पन्न भएमा आफुलाई अचेतना गराउने चिकित्सकसंग सम्पर्क राख्नु होला ।

Setting Up Your Epidural

इपिड्यूरल राख्ने प्रक्रिया

संभवत तपाईंलाई एउटा नशामा औषधि दिने सुइ तथा सलाइन पानी दिनुपर्ने हुन सक्दछ ।

इपिड्यूरल राख्ने बेलामा स्थिर भएर वस्नु पर्दछ र प्रसववेदना सुरुभएमा तुरुन्त चिकित्सकलाई खबर गर्नु पर्दछ ।

साधारणतया इपिड्यूरल राख्ने प्रक्रियाका निम्ती २० मिनेट लाग्दछ र यसले काम गर्नको निम्ती थप २० मिनेटको आवश्यकता पर्दछ ।

कुनै कुनै इपिड्यूरलले राम्रोसंग र पूर्णरूपले काम नगर्नाले यदाकदा यसलाई पुन राख्नु पर्ने स्थिति आउन सक्दछ ।

Advantages of an Epidural

इपिड्यूरलका फाइदाहरु

यो एउटा राम्रो दुखाई कमगर्ने माध्यम हो र कहिलेकहि छिटो काम गरिस भनेर स्पाइनल पनि दिइन्छ । औषधिको प्रकार र मात्रा बदलेर तपाइलाई हिडन सक्ने बनाउन सकिन्छ । यस प्रकारको इपिड्यूरललाई कम मात्राको इपिड्यूरल अथवा हिडज मिल्ने इपिड्यूरल भनिन्छ । सामान्यतया यसले गर्भमा रहेको बच्चालाई असर गर्दैन । यदि सत्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आएमा यसलाई थप्न सकिन्छ ।

Possible Problems with Epidural

इपिड्यूरलबाट हुनसक्ने सम्भावित समस्याहरु

बारम्बार औषधि थप्नाले र मात्रा धेरै हुनाले खुट्टा भारी हुने र लठ्ठिने हुन सक्दछ । जसका कारण Forceps र Ventose को माध्यमबाट बच्च जन्माउने अवस्था आउन सक्दछ । प्रसवको दोस्रो अवस्थालाई केहिहदसम्म लम्ब्याउन सकिन्छ । यसका कारण तपाईंको रक्तचाप घट्ने, चिलाउने र ज्वरो आउने हुन सक्दछ । इपिड्यूरल राखेको ठाउमा केहिदिन सम्म दुखाइ महशुस हुन सक्दछ । इपिड्यूरलका कारणले ढाड दुख्ने समस्या हुदैन । गर्भधारण पश्चात गर्भावस्थाका कारणले ढाड दुख्ने गर्दछ ।

यो जानकारीपत्रको पछाडीको भागमा यसका सम्भावित समस्याहरुका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।



Epidural Information Card

इपिड्यूरल सम्बन्धि जानकारीपत्र

प्रसव वेदना निराकरणका निम्ती राखिएको इपिड्यूरल वा स्पाइनलका कारण हुनसक्ने समस्याहरु र जोखिम यस प्रकार छन ।

	कतिमा हुन सक्दछ ?	कतिको सामान्य छ ?
रक्तचापमा आउने कमी	५० मा १	कहिलेकहि
पहिले दिएको औषधिले राम्ररी काम गर्न नसक्नुका कारण थप औषधि दिनुपर्ने अवस्था ।	८ मा १	सामान्य
औषधिले राम्ररी काम नगर्नाले शल्यक्रिया गर्दा पूर्णरूपमा बेहोस गर्नुपर्ने अवस्था ।	२० मा १	कहिलेकहि
टाउको दुख्ने ।	१०० मा १ इपिड्यूरल ५०० मा १ स्पाइनल	धेरैकम
स्नायु विग्रने खुट्टाको कुनै भाग लाटो हुने वा पूर्ण रूपले कमजोर हुने ।	केहिसमयका लागि १००० मा १	असम्भावित
छ महिना भन्दा बढि यो अवस्था रहिरहने ।	पुर्णकालिन १३००० मा १	धेरैअसम्भावित
इपिड्यूरलमा संक्रमण भएमा मेनइन्जाइटिस हुने संभावना रहने ।	५००० मा १	धेरैअसम्भावित
इपिड्यूरलमा रगत जम्ने ।	१००००० मा १	धेरैअसम्भावित
आर्कस्मिक बेहोसपन ।	१७०००० मा १	धेरैअसम्भावित
पूर्णरूपले प्यारालाइसिस हुन सक्ने ।	२५०००० मा १	धेरैअसम्भावित

यहा उल्लेखित सम्पूर्ण विवरणहरुले सम्भावित जोखिमहरुको पुर्णरूपमा संख्यात्मक हिसाब दिदैनन् । यी केवल प्रकाशित विवरणका आधारमा तयार पारिएका संख्या हुन । विभिन्न अस्पतालहरुमा यो संख्यामा परिवर्तन पनि हुन सक्दछ ।

